

Диарея и рвота у кошки: как действовать

Диарея и рвота у кошки — это тревожный сигнал. Эти признаки может говорить об инфекции или отравлении. Чем раньше вы оцените состояние питомца и свяжетесь с ветеринаром, позволяет начать лечение вовремя.

Жидкий стул и рвота могут быть вызваны разными причинами: поеданием несъедобного, инфекцией, испорченной пищей, простейшими. Не стоит давать лекарства наугад [круглосуточный выезд ветерача](#) и не использовать человеческие таблетки. Ниже разберём, какие симптомы должны насторожить, как помочь до осмотра и в каких случаях нужна скорая помощь.

Причины поноса и рвоты у кота

Рвота вместе с жидким стулом приводит к потере воды и солей. Причины можно разделить на несколько групп. Обычно рассматривают поедание жирной или испорченной пищи, кишечные инфекции, интоксикации, паразитарные инвазии и стресс. Случаются закупорка, патологии печени, почек или поджелудочной и побочное действие препаратов.

- Алиментарные факторы: резкая смена рациона
- Вирусы, бактерии, глисты
- Ядовитые вещества: недоброкачественная пища
- Эмоциональная нагрузка
- Заболевания органов

Точную причину по внешним признакам не установить. Доктор изучит частоту рвоты и характер стула, соберёт анамнез и может порекомендовать обследование. До приезда врача следите и записывать, что происходит.

Опасные признаки

Не всякая рвота и диарея одинаково тревожны, но есть признаки, требующие немедленного обращения. Если вы заметили хотя бы один из них, свяжитесь со специалистом без промедления. Задержка опасно для жизни.

Что наблюдается
Риск
Рвота более 2–3 раз за сутки
Быстрая потеря жидкости и электролитов
Тёмный дёгтеобразный стул
Возможны внутреннее кровотечение или тяжёлое поражение кишечника
Не пьёт
Обезвоживание нарастает быстро
Слабость
Признак истощения
Неконтролируемые движения
Неврологические нарушения
Твёрдый болезненный живот
Счёт идёт на часы
Рвота с примесью крови
Повреждение слизистой или внутреннее кровотечение
Не может встать
Угроза жизни

Особенно внимательными будьте маленькими котятками и старыми кошками. Их организм теряет жидкость стремительнее. Если у котёнка понос и рвота, лучше вызвать врача сразу. Также должны насторожить частые приступы и ухудшение состояния.

Что делать до приезда ветеринара

До приезда врача нужно действовать хладнокровно. Ровное поведение успокаивает кошку. Уберите опасные предметы: уберите всё, что может навредить. Не давайте лекарства без назначения — это может

навредить.

- Оставайтесь спокойными
- Обеспечьте безопасное место
- Не используйте средства для людей
- Слегка прижмите рану
- Запишите, что мог проглотить питомец
- Не поите насильно

Соберите сведения для специалиста: время появления симптомов, чем питался питомец, контактировал ли с токсинами, есть ли слабость или отказ от воды. Соберите информацию об инциденте — это поможет врачу быстрее оценить ситуацию.

Помощь в зависимости от ситуации

При кровотечении используйте чистый бинт. Когда есть признаки удушья попробуйте убрать предмет только если он хорошо виден. При термическом поражении не наносите лёд напрямую. При укусах ограничьте движение. При любом состоянии лучше дождаться указаний ветеринара.

Частые вопросы владельцев

Нередко хозяева не знают, что делать, при сочетании рвоты и диареи. Ниже собраны типичные вопросы и краткие пояснения. Важно помнить, что решение принимает врач.

- Стоит ли давать сорбенты
- Как поить, если не пьёт
- Можно ли кормить
- Что указывает на токсин
- В каких случаях нужен срочный вызов

Ситуации бывают разными. То, что помогло одному питомцу, не подойдёт вашему. Если вы не уверены обратитесь за помощью и рассказать детали.

Как помочь питомцу и когда нужен врач

При единичных эпизодах и животное пьёт, стоит следить за состоянием недолго. Однако при ухудшении — не ждите. Истощение нарастает стремительно.

Для проверки степени обезвоживания, можно аккуратно оттянуть кожу на холке: когда складка быстро выравнивается, можно наблюдать. Когда кожа не возвращается быстро — требуется осмотр. Не назначайте препараты сами — это опасно.

При необходимости, опишите симптомы оператору и не отключайтесь. Специалист подскажет, что делать до приезда врача. Это позволяет не навредить.

Профилактика и уход

Для профилактики контролируйте питание, убирайте опасные вещества, убирайте опасные игрушки. Регулярные визиты к врачу помогают заметить проблемы раньше.

1. Кормите качественным кормом
2. Меняйте воду регулярно
3. Убирайте опасные предметы
4. Консультируйтесь с врачом
5. Обращайтесь за помощью

Если у питомца уже было подобное состояние, расскажите об этом врачу. Это поможет выявить причину. Не занимайтесь самолечением.

Заключение

Диарея и рвота у кошки — серьёзный симптом. Не занимайтесь самолечением и обращайтесь за помощью вовремя. Сохраняйте спокойствие, уберите опасные предметы и вызовите специалиста.

Важно помнить: при своевременном обращении риски ниже. Внимательное отношение к питомцу снижает вероятность осложнений.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли давать коту активированный уголь при рвоте и поносе

Наугад не давайте лекарства, даже если кажется, что это безопасно. Способно ухудшить состояние. Обратитесь к специалисту.

Нужно ли насильно поить кота

Насильно поить не стоит: это может навредить. Когда кошка отказывается от воды обратитесь к ветеринару.

Можно ли кормить кота при рвоте и поносе

Кормить через силу не нужно. Когда аппетита нет нужна консультация. Рацион и режим назначит ветеринар.

Что указывает на отравление

Предположить интоксикацию можно при сочетании симптомов: тошнота, диарея, апатия, повышенное выделение слюны, припадки, не может встать. Окончательный вывод устанавливает врач.

В каких случаях нужна срочная помощь

Нужна немедленная помощь если рвота повторяется, кровавых примесей, если кошка не пьёт, потере активности, неврологических симптомах.

Вы работаете круглосуточно

Разумеется, мы работаем 24/7. Это важно, при внезапном ухудшении. Расскажите о симптомах и действуйте по рекомендациям.